

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)

C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

DLP 18-2-63 185015

Supplément N° 3 au Bulletin Technique N° 19 D'Avril 1962

1962-9

AVERTISSEMENTS

I - VIGNE -

Black-Rot : Dans les grains de raisin qui n'ont pas été enfouis par un chaussage, les périthèces de Black-Rot sont à maturité depuis le début du mois.

Des projections d'ascospores ont même été observées à partir de grains conservés dans les conditions d'une vigne abandonnée.

Les vignes bien débourees se trouvant à proximité de parcelles incultes peuvent être contaminées dès à présent. Il convient donc de les traiter.

II - ARBRES FRUITIERS -

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : De nouvelles attaques sont à redouter sur les jeunes poirettes ainsi que sur les premières feuilles et sur les boutons floraux des Pommiers. Nous conseillons donc un nouveau traitement dès réception de cette note.

Hoplocampe des Poires : En raison du retard de la végétation, les pontes sont parfois nombreuses sur les variétés à débourrement précoce.

Au moment où les jeunes larves vont éclore, une bouillie insecticide devrait être appliquée, dès à présent, en commençant par les variétés défleuries. Bien mouiller les organes floraux.

INFORMATIONS

Oïdium du Pommier : Sur les variétés sensibles à l'Oïdium, il serait utile d'envisager l'application d'un des produits indiqués sur la note spéciale.

Pucerons : Les premières colonies viennent d'apparaître. Nous rappelons que pour éviter les pullulations la lutte doit être entreprise dès la découverte des foyers.

III - COLZA -

Meligèthes et Charançons des Siliques : Dans les cultures de Colza où les premiers insectes viennent d'apparaître, il y a lieu de prévoir un traitement insecticide en observant les prescriptions relatives à la floraison.

Aux produits en autorisation provisoire de vente, contre les Charançons des Siliques du Colza qui vous ont été déjà indiqués il convient d'ajouter les Pyrèthrines.

IV - CULTURES DIVERSES -

Tipules : On nous signale fréquemment la présence de larves dans les cultures qui sont le plus souvent des Tipules.

Il ne faut pas confondre ces larves qui sont cylindriques, gris noirâtre et sans pattes avec les chenilles de *Cirphis unipuncta* déjà décrites dans le Bulletin Technique N° 18.

Le Contrôleur
chargé des Avertissements

C. ROUSSEL

Imprimerie de la Station de BORDEAUX
Directeur-Gérant : L. BOUYX

Bordeaux, le 25 Avril 1962

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

P 56